

QUICKSCAN SOORTENBESCHERMING

DE BLEEKVELDEN 24 EN 26 TE GELDROP

Colofon

Quicksan soortenbescherming

Projectnummer: EP.23.1062

Versie: 1

Datum: 17 juli 2023

Opdrachtnemer

Agrifirm NWE BV
Bedrijfsontwikkeling Exlan
Waalkade 33
5347 KR Oss

Postbus 300
5340 AH Oss

Locatie

De Bleekvelden 24 en 26 Geldrop

Contactpersoon

[REDACTED]

T: [REDACTED]

F: [REDACTED]

E: [REDACTED]

Uitvoerders

[REDACTED]

[REDACTED]

Collegiale check

[REDACTED]

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. NIETS UIT DEZE UITGAVE MAG WORDEN VERVEELVOUDIGD DOOR MIDDEL VAN DRUK, FOTOKOPIE, MICROFILM, GELUIDSBAND, ELEKTRONISCH OF OP WELKE ANDERE WIJZE DAN OOK, EN EVENMIN IN EEN GEAUTOMATISEERD GEGEVENSBESTAND WORDEN OPGESLAGEN, ZONDER VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN AGRIFIRM EXLAN.

Inhoudsopgave

Quickscan soortenbescherming

INLEIDING	4
HOOFDSTUK 1	6
TOETSINGSKADER	6
HOOFDSTUK 2	9
ONDERZOEKSRESULTATEN	9
HOOFDSTUK 3	20
CONCLUSIE	20
LITERATUUR	21
WAARNEMINGEN	22
EFFECTEN INDICATOR SOORTEN	28
PLAN PROJECTLOCATIE	30

Inleiding

Planbeschrijving

Aanleiding

Het plangebied is gelegen aan De Bleekvelden 24 en 26 te Geldrop. De plannen omvatten slopen van de bestaande bebouwing voor de bouw van een nieuw appartementencomplex. In dit kader wordt door het bevoegde gezag een toets aan de soortenbescherming noodzakelijk geacht. Bij de uitvoering van de voorgenomen ingrepen moet rekening worden gehouden met het huidige voorkomen van de, op grond van de Wet natuurbescherming, beschermde soorten. Als de voorgenomen ingreep leidt tot het overtreden van verbodsbepalingen betreffende beschermde soorten, moet vrijstelling of ontheffing worden verkregen.

De voorliggende quickscan bevat een inventarisatie van de huidige aanwezigheid van beschermde soorten planten en dieren in en om het plangebied. Tevens worden de te verwachten effecten van de ingreep in het plangebied beoordeeld.

Plangebied

Het plangebied ligt in de plaats Geldrop in de gemeente Geldrop-Mierlo. Het plangebied bevindt zich binnen de verkeerskundige en stedenbouwkundige bebouwde kom van Geldrop.



• Afbeelding 1: luchtfoto plangebied (bron: streetsmart.cyclomedia.com/streetsmart, geraadpleegd op 30/06/2023)

Onderzoeksmethode

Om een goede indicatie van de natuurwaarden binnen het plangebied te krijgen, wordt het onderzoek in verschillende stappen uitgevoerd. Op basis van bronnenonderzoek is nagegaan of er wettelijk beschermde planten- of diersoorten in het gebied voor kunnen komen waaraan extra aandacht geschonken dient te worden tijdens het terreinbezoek.

Na het bronnenonderzoek is een verkennend terreinbezoek gebracht aan het plangebied. Hierbij is, op basis van de gegevens van het literatuuronderzoek, beoordeeld voor welke soorten het gebied daadwerkelijk een geschikte habitat biedt en daarmee welke soorten er daadwerkelijk voor kunnen komen. Vervolgens zijn de mogelijke effecten op de verwachte beschermde soorten beschreven.

Op basis van de doorlopen procedures zijn conclusies getrokken met betrekking tot de eventuele negatieve effecten en/of obstakels inzake de Wet natuurbescherming.

Op donderdag 22 juni 2023 is de locatie tussen 10:00 en 11:00 uur ter plaatse geïnventariseerd, om te onderzoeken of het plangebied een zodanig belangrijke status heeft dat een aanvullend veldonderzoek noodzakelijk is. Op het moment van inventarisatie was het 17 graden Celsius en bewolkt.

Op basis van terreinkenmerken is beoordeeld of het terrein geschikt is voor de, in de regio voorkomende, beschermde soorten.

Doelstelling

Om een indicatie te krijgen van de effecten die de sloop- en bouwwerkzaamheden hebben op de natuurwaarden binnen het plangebied, dienen de volgende vragen te worden beantwoord:

1. Welke wettelijk beschermde soorten komen in het plangebied voor? Welke status hebben deze soorten?
2. Welke invloed heeft de geplande ingreep in het betreffende gebied op de beschermde soorten en komt daarmee de staat van instandhouding in gevaar?
3. Hoe dient omgegaan te worden met eventuele negatieve effecten van het plan op wettelijk beschermde planten- en diersoorten, en welke vervolgstappen zijn nodig?

1 Toetsingskader

Wet natuurbescherming

De bescherming van natuur is in Nederland vastgelegd in nationale wetgeving. De nationale wetgeving is een Nederlandse implementatie van de belangrijkste Europese wetgevingselementen. Per 1 januari 2017 zijn de Flora- en Faunawet, de Boswet en de Natuurbeschermingswet 1998 vervangen door de Wet natuurbescherming. De uitvoering van deze nieuwe wet is grotendeels in handen van de provincies gekomen.

1.1 Gebiedsbescherming

De Wet natuurbescherming noemt bekende maar ook enkele nieuwe soorten natuurgebieden die bescherming behoeven: de Natura 2000-gebieden, het Natuurnetwerk Nederland (NNN), bijzondere provinciale natuurgebieden en landschappen, bijzondere nationale natuurgebieden en de nationale parken. Bij ontwikkelingen met name in het buitengebied moet rekening worden gehouden met het al dan niet van toepassing zijn van de beschermingsregimes van deze natuurgebieden. Ieder gebied kent een eigen beschermingsregime dat afzonderlijk gewogen dient te worden in relatie tot plannen, projecten en andere handelingen met mogelijk nadelige effecten voor de beschermde natuurwaarden.

Natura 2000-gebieden

De bekendste natuurgebieden zijn de Natura 2000-gebieden, zij kennen tevens het meest strikte beschermingsregime. De basis voor Natura 2000 zijn de Europese Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. In Nederland zijn 164 gebieden als Natura 2000-gebied aangewezen. Voor ieder gebied zijn instandhoudingsdoelstellingen bepaald die betrekking kunnen hebben op de bescherming van specifieke flora en fauna alsook leefgebieden van soorten. Alle projecten en handelingen binnen of buiten de gebiedsgrenzen mogen geen verstorend of verslechterend effect hebben op de instandhoudingsdoelstellingen. Voor de voorgenomen ontwikkeling is hier, voor zover van toepassing, separaat aan getoetst. In deze rapportage wordt hier verder niet op ingegaan.

Natuurnetwerk Nederland

Het Natuurnetwerk Nederland (voorheen EHS) is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. Het netwerk moet natuurgebieden beter verbinden met elkaar en met het omringende agrarisch gebied. De provincies zijn belast met de taak een dergelijk netwerk tot stand te laten te komen en in stand te laten. De uitvoering hiervan is hoofdzakelijk gestuurd vanuit de ruimtelijke ordening (provinciale verordeningen). Binnen het Natuurnetwerk Nederland geldt een “nee, tenzij”- benadering.

Overige gebieden

Naast de bovengenoemde gebieden kunnen gebieden aangewezen worden als ‘bijzondere provinciale natuurgebieden’, ‘bijzondere provinciale landschappen’ of ‘nationaal park’. De bescherming van deze gebieden vindt net als bij het NNN plaats via het ruimtelijk spoor. Daarnaast kan een gebied aangewezen worden als ‘bijzonder nationaal gebied’, een soort voorloper van de aanwijzing als Natura 2000-gebied. De bescherming van deze gebieden stemt dan ook overeen met de bescherming van Natura 2000-gebieden.

1.2 Soortenbescherming

De Wet natuurbescherming deelt soorten in drie beschermingsregimes in. Daarnaast zijn er vrijgestelde soorten en jaarrond beschermde vogelnesten.

- 1) Beschermingsregime soorten vogelrichtlijn
- 2) Beschermingsregime soorten habitatrichtlijn
- 3) Beschermingsregime andere soorten
- 4) Vrijgestelde soorten
- 5) Jaarrond beschermde vogelnesten

Vogelrichtlijn

Onder de soorten van de Vogelrichtlijn vallen alle van nature in Nederland in het wild levende vogels. Het is verboden om:

- Opzettelijk vogels te doden of te vangen;
- Opzettelijk vogelnesten, -rustplaatsen en – eieren te vernielen of te beschadigen of vogelnesten weg te nemen;
- Eieren van vogels te rapen en deze onder zich te hebben;
- Opzettelijk vogels te storen, tenzij de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort.

Habitatrichtlijn

Onder de soorten van de Habitatrichtlijn vallen soorten die genoemd zijn in Bijlage IV van de Habitatrichtlijn, Bijlage I en II van het Verdrag van Bern en Bijlage I van het Verdrag van Bonn. In de Bijlagen van de Verdragen van Bern en Bonn worden ook vogels genoemd.

Wat betreft deze soorten is het verboden om:

- Opzettelijk dieren te doden of te vangen;
- Opzettelijk dieren te verstoren;
- Opzettelijk eieren van dieren te vernielen of te rapen;
- Voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren te beschadigen of te vernielen;
- Opzettelijk planten in hun natuurlijke verspreidingsgebied te plukken, te verzamelen, af te snijden, te onttwortelen of te vernielen.

Ook is het verboden deze soorten te verkopen, te vervoeren voor verkoop, te verhandelen, te ruilen of te kopen, tenzij het gaat om gefokte of gekweekte dieren of planten.

Andere soorten

Onder het beschermingsregime andere soorten vallen soorten waarvan er geen Europese verplichting tot bescherming is. Dit zijn soorten die vanuit nationaal belang extra bescherming behoeven. Het beschermingsniveau van deze soorten kan per provincie verschillen.

Het is verboden om:

- 1) Opzettelijk dieren te doden of te vangen;
- 2) Voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren te beschadigen of te vernielen;
- 3) Opzettelijk (vaat)planten in hun natuurlijke verspreidingsgebied te plukken te verzamelen, af te snijden, te onttwortelen of te vernielen.

Provincies hebben de bevoegdheid om bij provinciale verordening vrijstelling te verlenen voor nationaal beschermde soorten.

Vrijgestelde soorten

De verboden zijn niet van toepassing op de bosmuis, de huisspitsmuis en de veldmuis voor zover deze dieren zich in of op gebouwen of daarbij behorende erven of roerende zaken bevinden. Ook vallen de zwarte rat, bruine rat, huismuis, de mol en exoten niet onder beschermingsregime van de Wet natuurbescherming en mogen opzettelijk gedood en gevangen worden. Daarnaast geldt, zoals hierboven reeds aangegeven, dat provincies de bevoegdheid hebben vrijstelling te verlenen voor bepaalde soorten.

Jaarrond beschermde vogelnesten

De opgestelde lijst met jaarrond beschermde nesten voor vogels is een beleidsdocument dat voortvloeit uit de voormalige Flora- en faunawet en meegenomen is onder de Wet natuurbescherming. De nesten zijn ingedeeld in categorieën (1 t/m 5) waarvan de categorie 1 t/m 4 jaarrond beschermd zijn. Nesten in categorie 5 zijn enkel beschermd bij afwezigheid van voldoende alternatieven.

- 1) Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het broedseizoen in gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats
- 2) Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar.
- 3) Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar.
- 4) Vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks in staat zijn een nest te bouwen.
- 5) Nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar daarvoor hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wel over voldoende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen.

1.3 Houtopstanden

De regels van de Boswet zijn grotendeels onveranderd opgenomen in de Wet natuurbescherming. Een houtopstand is een zelfstandige eenheid van bomen, boomvormers, struiken, hakhout of griend, die een oppervlakte van 10 are of meer beslaat ofwel een rijbeplanting die meer dan twintig bomen omvat.

Buiten de bescherming vallen:

- houtopstanden binnen de bij besluit van de gemeenteraad vastgestelde grenzen van de bebouwde kom (voor deze wet);
- houtopstanden op erven of in tuinen
- fruitbomen en windschermen om boomgaarden;
- naaldbomen bedoeld als kerstbomen en niet ouder dan twintig jaar
- kweekgoed;
 - uit populieren of wilgen bestaande wegbeplantingen,
 - beplantingen langs waterwegen, en
 - eenrijige beplantingen langs landbouwgronden;
- Het dunnen van een houtopstand;
- uit populieren, wilgen, essen of elzen bestaande beplantingen die zijn bedoeld voor de productie van houtige biomassa indien zij:
 - ten minste eens per tien jaar worden geoogst;
 - bestaan uit minstens tienduizend per hectare per beplantingseenheid
 - bestaande uit een aaneengesloten beplanting die niet wordt doorsneden door onbeplante stroken breder dan twee meter;
 - zijn aangelegd na 1 januari 2013.

2

Onderzoeksresultaten


2.1 Bronnenonderzoek

Gegevens van websites als www.waarneming.nl zijn geraadpleegd voor achtergrondinformatie. Een groot aantal amateurs en professionals publiceert op deze bekende websites zijn natuurwaarnemingen, die worden gecontroleerd door een validatiecommissie. Zodoende zijn de waarnemingen uit deze bronnen redelijk betrouwbaar, maar moeilijk te verifiëren. De waarnemingen geven eventueel wel een indicatie van soorten waar tijdens het veldonderzoek extra aandacht aan besteed dient te worden.

Natuurnetwerk Nederland

Het natuurbeheerplan is een beleidskader om het Europese, rijks- en provinciale natuur- en landschapsbeleid te realiseren. Het gaat hier om bestaande natuurgebieden, gebieden waar nieuwe natuur aangelegd wordt, landbouwgebieden worden ingericht en beheerd volgens agrarisch natuurbeheer en de Natura 2000-gebieden.

Het plangebied ligt buiten het Natuurnetwerk Nederland en buiten andere natuurgebieden zoals Natura 2000. Het meest dichtbijgelegen Natura 2000-gebied is het Natura 2000-gebied “Strabrechtse Heide & Beuven” en ligt op een afstand van ruim 1,6 km ten zuiden van de projectlocatie. Het meest dichtbijgelegen Natuurnetwerk is gelegen op een afstand van ca 65 meter ten westen van de projectlocatie.



• Afbeelding 2: ligging Natuurnetwerk Nederland en Natura 2000
(bron: atlasleefomgeving.nl/kaarten, geraadpleegd op 30/06/2023)

Het Natuurnetwerk Brabant is onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland. Het is een netwerk van deels bestaande en deels nieuwe natuurgebieden die door ecologische verbindingzones met elkaar verbonden zijn. Hierdoor kunnen dieren zich makkelijker verplaatsen tussen verschillende natuurgebieden. Zo wordt de biodiversiteit (het totaal aan planten en dieren) bevorderd. Ongeveer 90% van het Natuurnetwerk Brabant wordt gevormd door bestaande natuurgebieden zoals bijvoorbeeld de Biesbosch en de Maashorst. Maar het

netwerk is nog niet compleet. Er ontbreken nog veel gebieden en verbindingen die belangrijk zijn voor dieren en planten. Vanwege de klimaatverandering veranderen hun leefomstandigheden en wordt dat nog urgenter. Zij moeten zich kunnen verplaatsen om genoeg voedsel te kunnen blijven vinden en zich voort te planten. Maar het Natuurnetwerk is er niet alleen voor planten en dieren, maar ook voor mensen. Mensen genieten, recreëren en ontspannen in de natuur en voelen zich gelukkiger. Natuur schept kansen voor ondernemers die natuur en hun bedrijf willen combineren en helpt tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Binnen het Natuurnetwerk Nederland geldt een “nee, tenzij”- benadering. Het project is niet gelegen binnen het Natuurnetwerk Nederland en dus kan geconcludeerd worden dat het project geen gevolgen heeft voor het Natuurnetwerk.

2.2 Veldonderzoek

Op verschillende punten in het plangebied zijn waarnemingen verricht. Tijdens het veldbezoek is het gebied beoordeeld op de aanwezigheid van beschermde soorten en de habitatgeschiktheid voor beschermde soorten. Er is extra aandacht besteed aan de mogelijke aanwezigheid van vleermuizen en vogelnesten.

De ecologische factoren in de omgeving zijn met behulp van een digitale fotocamera vastgelegd. Om de flora en fauna te kunnen determineren, is gebruik gemaakt van eigen kennis en literatuur



• Afbeelding 3: Voorgevel te slopen pand met daarvoor bestrating



- Afbeelding 4: gevel zijde Johan Peijnenburgweg met naast het pand gras dat regelmatig gemaaid wordt en een rij zomereiken van circa 15 jaar.



- Afbeelding 5: Detail gevel zijde Johan Peijnenburgweg, overstek van trespa en metselwerk zonder open stootvoegen



- Afbeelding 6: Gevel aan zijde Johan Peijnenburgweg, damwand gevelbeplating



- Afbeelding 7: Detail gevel met trespa overstek en metselwerk zonder open stootvoegen



- Afbeelding 8: Fragment voorgevel te slopen gebouw



• Afbeelding 9: Projectlocatie vanaf de straatzijde



• Afbeelding 10: Coniferen haag rondom Pnem-huisje



• Afbeelding 11: Haagbeuk met een duivennest

Flora algemeen

Bij de planlocatie zijn geen bijzondere beplantingen aangetroffen. Er is tevens gelet op de aanwezigheid van (beschermde) muurvegetatie. Er is zeer weinig erfbeplanting aangetroffen. Deze erfbeplanting bestaat uit een beukenhaag en een coniferenhaag rondom een Pnem-huisje. Verder opgaand gras met algemene kruiden aan de zijde van de Johan Peijnenburgweg. Dit gras wordt regelmatig kort gemaaid.

Grondgebonden zoogdieren

Specifiek wordt bekeken of binnen de betreffende projectlocatie verwacht kan worden of er streng beschermde zoogdieren; steenmarter, bunzing, hermelijn, wezel, eekhoorn, bever en das kunnen worden aangetroffen. Door de aanwezigheid van (verwilderde) katten uit de buurt, is dit geen interessante locatie voor grondgebonden zoogdieren.

Steenmarter

De onderzoekslocatie vormt geschikt habitat voor de steenmarter. Steenmarters gebruiken hooizolders, loze ruimtes onder het dak, schuurtjes en dergelijke, als verblijfplaats. Een steenmarter heeft binnen zijn territorium verscheidene verblijfplaatsen. Daarnaast laten steenmarters enorm veel sporen achter. Tijdens het veldbezoek zijn geen sporen, zoals uitwerpselen of prooiresten aangetroffen die duiden op het gebruik van de onderzoekslocatie als vaste rust- of verblijfplaats door deze soort.

Kleine marterachtigen

De onderzoekslocatie biedt geen geschikte verblijflocaaties voor de hermelijn, wezel en bunzing. De soorten maken gebruik van oude hopen van onder andere mollen en muizen, maar ook houtwallen, steenhopen en ruimtes onder boomwortels. Desbetreffende soorten hebben binnen hun territorium verscheidene verblijfplaatsen. Tijdens het veldbezoek zijn er geen marters of sporen van marters aangetroffen op de onderzoekslocatie. Echter, dit betekent niet dat het gebied niet potentieel in gebruik is door de hermelijn, wezel en/of bunzing als migratieroute. Gezien de onderzoekslocatie kleiner is dan één hectare kan gesteld worden dat deze geen essentieel onderdeel uitmaakt van het leefgebied van een van genoemde soorten (Bouwens 2017). Indien bij sloop/herinrichting van het gebied groenstructuren rond het perceel behouden blijven, is er geen sprake van een negatief effect op genoemde soorten.

Eekhoorn

De onderzoekslocatie is vanwege de afwezigheid van bomen niet geschikt als habitat voor de eekhoorn. Er staan te weinig bomen rondom de projectlocatie. Tevens worden er met de werkzaamheden geen bomen verwijderd. Mogelijk dat er eekhoorns leven in het gebied rondom de Kleine Dommel (onderdeel van het Natuurnetwerk), maar dat is op flinke afstand van de projectlocatie. Een negatief effect als gevolg van de werkzaamheden is uitgesloten.

Bever

Voor de bever is op de onderzoekslocatie geen geschikt habitat aanwezig. Vaste rust- en verblijfplaatsen van de bever kunnen worden uitgesloten.

Das

Tijdens het veldbezoek zijn op de onderzoekslocatie en de directe omgeving geen loop- of eetsporen, latrines en/of wissels aangetroffen die duiden op de aanwezigheid en/of het gebruik van de onderzoekslocatie door de das. Dassen zullen eerder hun leefgebied hebben in de nabijgelegen natuurgebieden en de aansluitende weilanden. Verstoring ten aanzien van de das als gevolg van de voorgenomen ingreep is niet aan de orde.

Het voorkomen van overige grondgebonden zoogdieren waarvoor geen vrijstelling geldt, is tijdens het veldbezoek niet vastgesteld.

Vleermuizen

Het plangebied is zeer nauwkeurig beoordeeld op de mogelijke waarde voor vleermuizen. Hierbij is gelet op de geschiktheid van de aanwezige bebouwing als verblijfplaats voor deze dieren: aanwezigheid van spouwgangen en andere openingen in muren en daken, vetstrepen, uitwerpselen en prooiresten bij gevelopeningen.

Verblijfsruimte voor vleermuizen hebben specifieke voorwaarden zoals een stabiele temperatuur en het tochtvrij zijn. Bij vleermuizen worden vier verblijfplaatsen onderscheiden; winterverblijven, zomerverblijven, kraamverblijven en paarverblijven. Aan de winterverblijven worden de hoogste eisen gesteld, daarna de kraamverblijven, dan de zomerverblijven en tenslotte de paarverblijven, waarbij de vleermuizen een zeer korte tijd op een bepaalde locatie kunnen verblijven.

De gevels van de te slopen gebouwen bestaan uit metselwerk zonder open stootvoegen en stalen damwand beplating. De dakgoot is van trespas waarin geen spleten zitten om in te vliegen. De dakconstructie van de te slopen gebouwen bestaat uit plat dak met dakleer. Ook hierin zitten geen holten om in te nestelen en de temperatuur is niet stabiel gedurende de dag en aan enorme temperatuurschommelingen onderhevig zijn. Ook de dakconstructie is hierdoor geen geschikte verblijfsplaats voor vleermuizen.

Er zijn in en om de te slopen gebouwen geen sporen (vetstrepen, uitwerpselen, prooiresten) aangetroffen.

Foerageerhabitat

De onderzoekslocatie zal, gelet op de aanwezige habitat, gebruikt kunnen worden door in de omgeving verblijvende vleermuizen om te foerageren. De plannen zullen echter geen aantasting van belangrijk foerageerhabitat vormen. Door de voorgenomen ingreep zal het aanbod van foerageermogelijkheden niet in het geding komen. In de directe omgeving is meer geschikt foerageerhabitat voor vleermuizen aanwezig in de vorm van bomenrijen en bosranden.

Vliegroutes

Vleermuizen maken veelal gebruik van lijnvormige (donkere) landschapselementen zoals houtsingels, beken en lanen om zich te verplaatsen tussen verblijfsplaatsen en foerageergebieden. Doordat dergelijke lijnvormige elementen ontbreken op de onderzoekslocatie, worden er geen potentiële vliegroutes verstoord.

Vogels

Tijdens het bezoek is met name gelet op de aanwezigheid van nesten en rustplaatsen voor vogels.

Er zijn broedvogels waarvan de nesten ook beschermd zijn op het moment dat ze niet voor de voortplanting in gebruik zijn. Dit kunnen dit zijn: boomvalk, buizerd, havik, sperwer, wespendif, huismus, steenuil en de kerkuil.

Boomvalk

De boomvalk is een soort die geen eigen nest maakt, maar broedt in gebruikte kraaien- en/of eksternesten in verschillende typen bos(randen) of in solitaire bomen, populierensingels, of op erven. De soort komt vooral voor in open en halfopen landschappen zoals boerenland en dorpen, alsook in buitenwijken van steden. De bomen op- en nabij de projectlocatie zijn gecontroleerd op dergelijke nesten, deze zijn niet aangetroffen. Evenmin worden er met de beoogde werkzaamheden bomen verwijderd. Negatieve effecten op de boomvalk als gevolg van de werkzaamheden zijn derhalve niet aan de orde.

Buizerd en havik

De buizerd en havik broeden op grote nesten van ongeveer een meter in doorsnede en 60 centimeter diep. Dergelijke nesten zijn tijdens het veldbezoek niet waargenomen. Een broedgeval van de buizerd en havik is daarom uit te sluiten. Eveneens worden er met de beoogde werkzaamheden geen bomen gekapt, zodat het wegnemen van een jaarrond beschermd nest kan worden uitgesloten.

Wespendief en sperwer

De wespendif is doorgaans gebonden aan grotere bosgebieden van zowel loof- als naaldbomen. Bij voorkeur is er afwisseling binnen het bosgebied aanwezig in de vorm van open plekken. De sperwer broedt bij voorkeur meer verborgen in naaldbomen. Beide situaties zijn op de onderzoekslocatie niet aanwezig. Gezien de ligging van de onderzoekslocatie in de bebouwde kom en de afwezigheid van voldoende dekking is een nestplaats van de sperwer of wespendif niet te verwachten. Eveneens zijn er tijdens het veldbezoek geen nesten aangetroffen. Een broedgeval van zowel de wespendif als de sperwer zijn uitgesloten.

Steenuil en kerkuil

De kerkuil en steenuil hebben een voorkeur voor cultuurlandschappen met allerlei landschapselementen die voor afwisseling zorgen. Beide soorten broeden in gebouwen en gebruiken ook graag speciale nestkasten. Daarnaast worden door de steenuil ook wel boomholten gebruikt, mits er zich grote holten in bevinden. Het gebouw zijn in zijn geheel gecontroleerd op de aanwezigheid van steen- en kerkuilen en is vooral gelet op de aanwezigheid van sporen; braakballen, veren en uitwerpselen. Er zijn geen (sporen van) steen- en kerkuilen waargenomen. Er is geen sprake van een afname van belangrijk foerageergebied. Een logischer foerageergebied voor de steenuil en kerkuil is het gebied rondom de Kleine Dommel. Daar zijn veel bomen en open ruimten aanwezig. Er blijft dus voldoende foerageergebied aanwezig in de omgeving.

Huismus

Ook voor de huismus, die veel te vinden is in de bebouwde omgeving, en vooral gebonden aan gebouwen is, is het nest jaarrond beschermd. Er zijn geen nesten van huismussen gevonden in de te slopen bebouwing. Daarvoor is het pand ook niet geschikt, aangezien een huismus bij voorkeur nestelen onder dakpannen met een dakgoot eronder. Ook is de huismus niet gehoord tijdens het locatieonderzoek.

Overige broedvogels

De beplanting op de onderzoekslocatie kan nestgelegenheid bieden aan broedvogelsoorten zoals de merel en winterkoning. De nesten van deze soorten zijn alleen beschermd op het moment dat ze als zodanig in gebruik zijn. In de haagbeuk zit een duivennest. Voor de duif zijn voldoende nestgelegenheden in de omgeving. Deze soort is niet kritisch bij het bouwen van een nest.

Er zijn vogels gezien en gehoord, namelijk:

• Tabel 1: overzicht waargenomen vogels

Soort
Gierzwaluwen (overvliegend)
Heggemus

• Tabel 2: overzicht waargenomen vogelnesten

Soort
Duif (geen specifieke nestbescherming)

Uitleg bij tabel:

- Categorie 1: Jaarrond gebruikte nesten (steenuil)
- Categorie 2: Zeer honkvaste koloniebroeders of afhankelijk bebouwing
- Categorie 3: Zeer honkvaste broeders of afhankelijk bebouwing (geen kolonie)
- Categorie 4: Vogels die ieder jaar terugkeren naar specifiek nest
- Categorie 5: Honkvaste broeders, maar voldoende flexibel

Reptielen, amfibieën en vissen

Er zijn tijdens het terreinbezoek geen reptielen, amfibieën en/of vissen waargenomen.

Voor de in Nederland voorkomende reptielsoorten zoals de hazelworm, de levendbarende hagedis en ringslang biedt de onderzoekslocatie geen geschikt habitat. Deze soorten worden vrijwel alleen aangetroffen in specifieke natuurgebieden.

Dit geldt ook voor de specifieke beschermende amfibieënsoorten die veel eisen stellen aan zijn habitat; alpenwatersalamander, heikikker, vinpootsalamander, poelkikker en

rugstreeppad. Deze zijn allen uit te sluiten omdat de betreffende locatie geen goed habitat biedt voor deze soorten door het ontbreken van voldoende oppervlaktewater.

De onderzoekslocatie vormt wel een geschikt habitat voor algemene amfibieënsoorten als de bruine kikker en de gewone pad. Op de onderzoekslocatie kunnen deze soorten beschutting vinden tussen de begroeiing en onder takken- of stenenhoppen. Voor algemene amfibieënsoorten geldt in het kader van de Wet natuurbescherming een vrijstelling, zodat een ontheffing bij verstoring niet noodzakelijk is. Het is echter wel zaak om aandacht te schenken aan de zorgplicht.

Vissen

Vanwege het ontbreken van oppervlaktewater op de onderzoekslocatie kan deze soortgroep buiten beschouwing worden gelaten.

Overige

Van de overige soortgroepen, zoals dagvlinders, insecten en libellen, kan worden aangenomen dat deze soorten gedurende het jaar in het plangebied aanwezig kunnen zijn of dit gebied in de migratieroute hebben liggen.

Afhankelijk van het seizoen zijn mogelijk algemene soorten te vinden op/of binnen de planlocatie. Specifieke beschermende soorten zijn voornamelijk afhankelijk van specifieke terreinkenmerken met specifieke biotopen. Binnen het plangebied is een dergelijk biotoop niet aanwezig.

2.3 Effecten van de ingreep

De effecten op beschermde soorten zijn onderzocht op basis van het voornemen binnen het plangebied.

Flora algemeen

Er is geen bijzondere flora aangetroffen binnen het plangebied, negatieve effecten zijn uitgesloten.

Grondgebonden zoogdieren

Verstoring van algemene zoogdieren vindt mogelijk plaats. De onderzoekslocatie vormt geschikt habitat voor een aantal soorten grondgebonden zoogdieren. Het gaat daarbij om algemene soorten als de egel, konijn en diverse muissoorten. De verblijfplaatsen van deze soorten worden door de voorgenomen ingreep echter niet aangetast. Verblijfplaatsen van beschermde zoogdiersoorten zijn ter plaatse niet aangetroffen.

Vleermuizen

Er zijn geen sporen van vleermuizen aangetroffen waaruit blijkt dat de gebouwen als verblijfplaats worden gebruikt. Nader onderzoek in het kader van de soortenbescherming is niet noodzakelijk.

Vogels

Door de voorgenomen ingreep worden geen vogels en jaarrond beschermde nesten aangetast.

Reptielen, amfibieën en vissen

Er zijn geen reptielen, amfibieën en/of vissen waargenomen. De instandhoudingsdoelstellingen komen niet in het gedrang.

Overige

Omdat er geen geschikt biotoop is waargenomen voor overige beschermde soorten, zijn negatieve effecten uitgesloten. Nader onderzoek is niet noodzakelijk.

3

Conclusie en aanbevelingen

Het natuuronderzoek is gebaseerd op inventarisatiegegevens van derden, literatuuronderzoek en een verkennend veldbezoek aan het plangebied. Het beeld dat uit het onderzoek naar voren is gekomen vormt voldoende basis om gefundeerd uitspraken te doen over de gevolgen van de voorgenomen werkzaamheden voor beschermde soorten en gebieden.

3.1 Conclusie

Voor de bepaling van de effecten en voor de beantwoording van de vraag of men in strijd komt met de Wet natuurbescherming, wordt de relatie gelegd tussen het initiatief met deze wet door waar mogelijk antwoord te geven op de volgende vragen:

1. *Welke wettelijk beschermde soorten komen in het plangebied voor? Welke status hebben deze soorten?*
2. *Welke invloed heeft de geplande ingreep in het betreffende gebied op de beschermde soorten en de staat van instandhouding?*
3. *Hoe dient omgegaan te worden met eventuele negatieve effecten van het plan op wettelijk beschermde planten- en diersoorten, en welke vervolgstappen zijn nodig?*

Het voornemen zoals opgenomen in de inleiding en de daarbij behorende werkzaamheden, zal naar verwachting geen negatief effect hebben op de staat van instandhouding van beschermde soorten. Binnen het plangebied zijn geen (verblijfplaatsen van) strikt beschermde soorten aangetroffen die door de werkzaamheden worden beïnvloed.

Uit de effectenbeschrijving blijkt dat er geen onevenredige directe of indirecte gevolgen zijn van de voorgenomen activiteiten op de voortplanting en instandhouding van beschermde dieren/of plantsoorten. Lokaal zullen mogelijk algemene soorten uit het plangebied trekken op zoek naar een vervangende biotoop.

Voor aanvang van de werkzaamheden dient derhalve geen aanvullend onderzoek plaats te vinden. Een ontheffing met betrekking tot aantasting van beschermde soorten is niet nodig. De werkzaamheden kunnen leiden tot een beschadiging of vernietiging van mogelijke verblijfplaatsen en/of verstoring van eventueel aanwezige algemene soorten. Een algehele vrijstelling op basis van de Verordening natuurbescherming voor ruimtelijke ontwikkelingen is hierop van toepassing. De algemene zorgplicht blijft onverminderd van toepassing.




Literatuur

- Broekhuizen, S., Hoekstra, B., Laar, van, V., Smeenk, C. & Thissen, J.B.M., 1992
Atlas van de Nederlandse zoogdieren. Stichting uitgeverij van de KNNV, Utrecht.
- Europese Gemeenschappen,
Richtlijn no 92/409 inzake het behoud van de vogelstand. Brussel, 1979.
- Europese Gemeenschappen,
Richtlijn no 92/43 inzake instandhouding van de natuurlijke habitat en de wilde flora en fauna. Brussel, 1992.
- Provinciale Verordening (Wet) natuurbescherming
- Hollander, H., & Geest, van der, P., 1994.
Rode-Lijst van bedreigde zoogdieren in Nederland.
Red data book of threatened mammals in the Netherlands. Vereniging voor Zoogkunde en Zoogdierbescherming, Utrecht.
- Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Ministerie van Volkshuisvesting.
Ruimtelijke Ordening en milieu, 2004. Nota Ruimte.
- De Nederlandse libellen, Nederlandse Fauna, deel 4
Nationaal historisch museum, KNNV uitgeverij (2002)
- Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming (VZZ)
- Vleermuizen en planologie, Zoogdierverseniging (2010)
- Wet natuurbescherming.
Vastgesteld d.d. 1 januari 2017.
- www.waarneming.nl
- www.synbiosys.alterra.nl
- www.atlasleefomgeving.nl
- www.ravon.nl
- www.sovon.nl
- www.google.nl
- www.floron.nl
- www.ruimtelijkeplannen.nl
- www.natura2000.nl
- www.ecologica.eu

1 Bijlage

Waarnemingen



Geldrop-Mierlo (gemeente) Noord-Brabant

Details	Waarnemingen	Foto's	Geluiden	Soorten gezien	Ranglijst waarnemers	BioBlitzes
2022-06-30	2023-06-30	Selecteer een soort	Alle soortgroepen	Alle zeldzaamheden		
Zoek	Waarnemingen van iedereen	Filter	Wis filters	Als kaart	☐ Toon geavanceerd	
Datum	Soort	Aantal	Locatie	Waarnemer		
2023-06-30 13:43	▲ Bruin zandoogje - <i>Maniola jurtina</i>	1 imago, gezien	Gijzenrooi-Oost	Harrie Broeksteeg		
2023-06-30 13:41	▲ Bruin zandoogje - <i>Maniola jurtina</i>	1 imago, gezien	Gijzenrooi-Oost	Harrie Broeksteeg		
2023-06-30 11:53	▲ Groefbijendoder - <i>Cerceris rybyensis</i>	1 imago	Geldrop	Martien		
2023-06-30 10:15	■ Muurrouwzwever - <i>Anthrax anthrax</i>	1 imago	Geldrop	*hvg61!		
2023-06-30 14:06	▲ Gewone regendaas - <i>Haematopota pluvialis</i>	1 imago	Dierenrijk Europa	Tim 5		
2023-06-30 12:07	▲ Kleine rode weekschild - <i>Rhagonycha fulva</i>	1 imago	Gijzenrooi-Oost	Rob Brinkhof		
2023-06-30 14:19	▲ Klein streepzaad - <i>Crepis capillaris</i>	1	Gijzenrooi-Oost	Jan Schellekens		
2023-06-30 14:19	▲ Gele ganzenbloem - <i>Glebionis segetum</i>	1	Gijzenrooi-Oost	Jan Schellekens		
2023-06-30 08:49	▲ Klein springzaad - <i>Impatiens parviflora</i>	1	Geldrop	Marcel Duiven		
2023-06-29 11:04	▲ Ooievaar - <i>Ciconia ciconia</i>	1 overvliegend	Mierlo	Piet Cruijters		
2023-06-29	▲ Kauw - <i>Coloeus monedula</i> ?	1	Mierlo	Fem en Jon		
2023-06-29 08:15	▲ Vos - <i>Vulpes vulpes</i>	1	Strabrechtse Heide	Bjorn Alards		
2023-06-29 18:01	▲ Bruin zandoogje - <i>Maniola jurtina</i>	1 imago	Geldrop	Mykola Niemtsov		
2023-06-29 14:11	▲ Knoopkruid - <i>Centaurea jacea</i>	1	Het Broek e.o.	Hedwig		
2023-06-29 14:16	▲ Klein streepzaad - <i>Crepis capillaris</i>	1	Het Broek e.o.	Hedwig		
2023-06-29 13:55	▲ Jakobskruid - <i>Jacobaea vulgaris</i> ?	1	Het Broek e.o.	Hedwig		
2023-06-29 12:15	■ Hengel - <i>Melampyrum pratense</i>	1	Gijzenrooi-Oost	Jac van Peer		
2023-06-29 12:00	▲ Krulpertje - <i>Hordeum murinum</i>	1	Het Broek e.o.	Cor		
2023-06-28	▲ Witte kwikstaart - <i>Motacilla alba</i>	1	't Wolfsven	Cor Treels		
2023-06-28	▲ Vink - <i>Fringilla coelebs</i>	1 ♀	't Wolfsven	Cor Treels		
2023-06-28 11:36	■ Eikenpage - <i>Favonius quercus</i>	1 imago	Het Broek e.o.	Anna		
2023-06-28	● Keizersmantel - <i>Argynnis paphia</i> ?	1 imago	't Wolfsven	Cor Treels		
2023-06-28 00:34	■ Zwarte-w-vlinder - <i>Macaria wauaria</i>	1 imago	Geldrop	Mykola Niemtsov		
2023-06-28 14:39	▲ Gamma-uil - <i>Autographa gamma</i>	1 imago	't Wolfsven	Cor Treels		
2023-06-28 00:35	▲ Gamma-uil - <i>Autographa gamma</i>	1 imago	Geldrop	Mykola Niemtsov		

Geldrop-Mierlo (gemeente) Noord-Brabant

Details

Waarnemingen

Foto's

Geluiden

Soorten gezien

Ranglijst waarnemers

BioBlitzes

2022-06-30

-

2023-06-30

Selecteer een soort

Alle soortgroepen

Alle zeldzaamheden

Zoek

Waarnemingen van iedereen

Filter

Wis filters

Als kaart

☐ Toon geavanceerd

Datum	Soort	Aantal	Locatie	Waarnemer	
2023-06-28 15:28	▲ Veldsprinkhaan onbekend - <i>Gomphocerinae</i> <i>indet.</i> ?	1	Luchenseheide	Guus Clemens	
2023-06-28 20:29	▲ Bijenwolf - <i>Philanthus triangulum</i>	1 imago	Geldrop	Anton	
2023-06-28	▲ Bijenwolf - <i>Philanthus triangulum</i>	3	't Wolfsven	Cor Treels	
2023-06-28 15:49	▲ Snor zweefvlieg - <i>Episyrphus balteatus</i>	1 imago	Luchen	Guus Clemens	
2023-06-28 09:47	▲ Segrijnslak - <i>Cornu aspersum</i>	1	Geldrop	Martien	
2023-06-28 09:25	▲ Moerasandoorn - <i>Stachys palustris</i>	1	Groot Goor	Kim van Goor	
2023-06-27 01:03	▲ Gestippelde houtvlinder - <i>Zeuzera pyrina</i>	1 imago	Geldrop	Mykola Niemtsov	
2023-06-27 06:41	▲ Schaduwtipspanner - <i>Idaea rusticata</i>	1 imago, op licht, lichtval	Geldrop	A Coomans	
2023-06-27 06:33	▲ Schaduwtipspanner - <i>Idaea rusticata</i>	1 imago, op licht, Led emmer	Geldrop	A Coomans	
2023-06-27 00:56	▲ Bruine snuituil - <i>Hypena proboscidalis</i>	1 imago	Geldrop	Mykola Niemtsov	
2023-06-27 06:45	Geogde worteluil - <i>Agrotis clavis</i>	1 imago, op licht, Led emmer	Geldrop	A Coomans	
2023-06-27 06:44	Geogde worteluil - <i>Agrotis clavis</i>	1 ♀ imago, op licht, Led emmer	Geldrop	A Coomans	
2023-06-27 06:42	Geogde worteluil - <i>Agrotis clavis</i>	1 imago, op licht, Led emmer	Geldrop	A Coomans	
2023-06-27 01:04	Bosgrasuil - <i>Apamea scolopacina</i>	1 imago	Geldrop	Mykola Niemtsov	
2023-06-27 00:58	▲ Gamma-uil - <i>Autographa gamma</i>	1 imago	Geldrop	Mykola Niemtsov	
2023-06-27 06:40	▲ Bleke langsprietmot - <i>Nematopogon swammerdamella</i> ?	1 imago, op licht, lichtval	Geldrop	A Coomans	
2023-06-27 06:42	▲ Grote meelmot - <i>Pyralis farinalis</i>	1 imago, op licht, Led emmer	Geldrop	A Coomans	
2023-06-27 06:43	▲ Gewone grasmot - <i>Chrysoteuchia culmella</i>	1 imago, op licht, Led emmer	Geldrop	A Coomans	
2023-06-27 18:32	▲ Struiksprinkhaan - <i>Leptophyes punctatissima</i>	1 imago, gezien	Geldrop	A Coomans	
2023-06-27 06:41	▲ Spookmug onbekend - <i>Chaoborus spec.</i> ?	1 imago, op licht, lichtval	Geldrop	A Coomans	
2023-06-27 06:33	▲ Spookmug onbekend - <i>Chaoborus spec.</i> ?	1 op licht, lichtval	Geldrop	A Coomans	
2023-06-27 19:22	Roodbaardroefvlieg - <i>Eutolmus rufibarbis</i>	1 imago	Geldrop	Martijn	
2023-06-27 06:42	▲ <i>Heterocerus spec.</i> ?	2 imago, op licht, lichtval	Geldrop	A Coomans	
2023-06-27 07:19	▲ Kaneelglasvleugelwants - <i>Corizus hyoscyami</i>	1 imago, gezien	Geldrop	A Coomans	
2023-06-27 18:31	▲ Bonte geelschild - <i>Campyloneura virgula</i>	1 imago, gezien	Geldrop	A Coomans	

Geldrop-Mierlo (gemeente) Noord-Brabant

Details Waarnemingen Foto's Geluiden Soorten gezien Ranglijst waarnemers BioBlitzes

2022-06-30 - 2023-06-30 Selecteer een soort Alle soortgroepen Alle zeldzaamheden

Zoek Filter Wis filters Als kaart Toon geavanceerd

Datum	Soort	Aantal	Locatie	Waarnemer	
2023-06-27 07:20	▲ Bladluis onbekend - <i>Aphidoidea</i> indet.	1 gal, geparasiteerd, gezien	Geldrop	A Coomans	■ 📷 📷
2023-06-27 06:42	▲ <i>Agraylea</i> spec.	1 imago, op licht, lichtval	Geldrop	A Coomans	■ 📷
2023-06-27 06:41	▲ <i>Agraylea</i> spec.	1 imago, op licht, lichtval	Geldrop	A Coomans	■ 📷
2023-06-27 19:37	▲ Gewone schorpioenvlieg - <i>Panorpa communis</i>	1 imago	Brandevoort	Ivo Senssen	✓ 📷
2023-06-27 06:48	▲ Wilde cichorei - <i>Cichorium intybus</i>	1	Gijzenrooi-Oost	mirjam	✓ 📷
2023-06-26 19:58	▲ Europese Haas - <i>Lepus europaeus</i>	2	Vaarle	Wim Hallink	✓
2023-06-26 12:19	▲ Groot dikkopje - <i>Ochlodes sylvanus</i>	2 imago, gezien	Molenheide	Krijn Olsthoorn	✓ 📷
2023-06-26 12:18	■ Roodbaardroefvlieg - <i>Eutolmus rufibarbis</i>	1 imago, gezien	Molenheide	Krijn Olsthoorn	✓ 📷
2023-06-26 12:51	■ <i>Mintho rufiventris</i>	1 imago	Mierlo	Loes Janssen	■ 📷
2023-06-26 16:21	■ <i>Crepidodera aurea</i> ?	1	Het Broek e.o.	Guus Clemens	■ 📷
2023-06-26 12:47	▲ Klit spec. - <i>Arctium</i> spec. ?	1	Geldrop	Ans Hartsuiker	■ 📷
2023-06-26 22:08	▲ Groot hoefblad - <i>Petasites hybridus</i>	1	Kasteeltuin	Ans Loffeld-Weusten	✓ 📷
2023-06-26 15:09	▲ Haagwinde - <i>Convolvulus sepium</i>	1	Mierlo	andreas theodor	✓ 📷
2023-06-26 15:12	▲ Witte klaver - <i>Trifolium repens</i>	1	Mierlo	andreas theodor	✓ 📷
2023-06-25 08:50	▲ Grote Bonte Specht - <i>Dendrocopos major</i>	3 ♂	Gijzenrooi-Oost	Richt van Empel-Nicolai	■
2023-06-25 12:43	▲ Gaai - <i>Garrulus glandarius</i>	1	't Zand	Ilse Koks	✓
2023-06-25 09:53	■ Geblokte stipspanner - <i>Idaea emarginata</i>	1 imago, op licht, Led emmer	Geldrop	A Coomans	✓ 📷
2023-06-25 11:14	▲ Huismoeder - <i>Noctua pronuba</i>	1 imago, gezien	Molenheide	Krijn Olsthoorn	✓ 📷
2023-06-25 09:54	▲ Gewone stofuil - <i>Hoplodrina octogenaria</i>	1 imago, op licht, Led emmer	Geldrop	A Coomans	■ 📷
2023-06-25 09:55	▲ Gevlamde bladroller - <i>Archips xylosteana</i> ?	1 imago, op licht, Led emmer	Geldrop	A Coomans	■ 📷
2023-06-25 11:54	▲ Azuurwaterjuffer - <i>Coenagrion puella</i>	1 imago	't Zand	Ilse Koks	✓ 📷
2023-06-25 18:33	■ Knopsrietje - <i>Myrmeleotettix maculatus</i> ?	1	Mierlo	Loes Janssen	■ 📷
2023-06-25 17:52	▲ Honingbij - <i>Apis mellifera</i>	1 imago	Geldrop	Wouter Steinmetz	✓ 📷
2023-06-25 17:45	▲ Honingbij - <i>Apis mellifera</i>	1 imago	Geldrop	Wouter Steinmetz	✓ 📷
2023-06-25 18:43	▲ Bijenwolf - <i>Phanthus triangulum</i>	20 imago, gezien	't Wolfsven	Krijn Olsthoorn	✓ 📷

Details

Waarnemingen

Foto's

Geluiden

Soorten gezien

Ranglijst waarnemers

BioBlitzes

2022-06-30

2023-06-30

Selecteer een soort

Alle soortgroepen

Alle zeldzaamheden

Zoek

Filter

Wis filters

Als kaart

☐ Toon geavanceerd

Datum	Soort	Aantal	Locatie	Waarnemer	
2023-06-25 09:54	▲ Dansmug onbekend - <i>Chironomidae</i> <i>indet.</i>	1 imago, op licht, lichtval	Geldrop	A Coomans	
2023-06-25 14:19	▲ Smalle randwants - <i>Conocerus acuteangulatus</i>	1 larve/nimf, gezien	Geldrop	Ben Gaxiola	
2023-06-25 16:22	▲ Schermhavikskruid - <i>Hieracium umbellatum</i>	1	Luchen	Guus Clemens	
2023-06-25 08:29	▲ Grijskruid - <i>Berteroa incana</i>	1 bloeiend	Gijzenrooi-Oost	Richt van Empel-Nicolaï	
2023-06-25 15:49	▲ Oosterse karmozijnbes - <i>Phytolacca acinosa</i>	1	't Wolfsven	Guus Clemens	
2023-06-25 16:33	▲ Knopig helmkruid - <i>Scrophularia nodosa</i>	1	Het Broek e.o.	Guus Clemens	
2023-06-25 15:57	▲ Trosvlier - <i>Sambucus racemosa</i>	1	't Wolfsven	Guus Clemens	
2023-06-24 09:37	▲ Fazant - <i>Phasianus colchicus</i>	1	Gijzenrooi-Oost	Martijn van der Weijde	
2023-06-24 12:40	▲ Scholekster - <i>Haematopus ostralegus</i>	2 adult, overvliegend, gezien en gehoord	Industrieterrein Spaarpot	Regina Oors	
2023-06-24 19:19	▲ Kleine Mantelmeeuw - <i>Larus fuscus</i>	1 adult	Gulberg	Joep Verbraak	
2023-06-24 14:46	▲ Koolmees - <i>Parus major</i>	2	Gijzenrooi-Oost	Martijn van der Weijde	
2023-06-24 14:43	▲ Tijftjaf - <i>Phylloscopus collybita</i>	1 baltsend / zingend	Gijzenrooi-Oost	Martijn van der Weijde	
2023-06-24 22:51	■ Bosrietzanger - <i>Acrocephalus palustris</i>	1 baltsend / zingend	Gijzenrooi-Oost	Martijn van der Weijde	
2023-06-24 14:44	■ Spotvogel - <i>Hippolais icterina</i>	1 baltsend / zingend	Gijzenrooi-Oost	Martijn van der Weijde	
2023-06-24 09:37	■ Spotvogel - <i>Hippolais icterina</i>	1 baltsend / zingend	Gijzenrooi-Oost	Martijn van der Weijde	
2023-06-24 14:43	▲ Zwartkop - <i>Sylvia atricapilla</i>	1 baltsend / zingend	Gijzenrooi-Oost	Martijn van der Weijde	
2023-06-24 14:50	▲ Grasmus - <i>Curruca communis</i>	1	Gijzenrooi-Oost	Martijn van der Weijde	
2023-06-24 14:48	▲ Grasmus - <i>Curruca communis</i>	1	Gijzenrooi-Oost	Martijn van der Weijde	
2023-06-24 14:45	▲ Grasmus - <i>Curruca communis</i>	1	Gijzenrooi-Oost	Martijn van der Weijde	
2023-06-24 14:43	▲ Grasmus - <i>Curruca communis</i>	1	Gijzenrooi-Oost	Martijn van der Weijde	
2023-06-24 14:42	▲ Grasmus - <i>Curruca communis</i>	1	Gijzenrooi-Oost	Martijn van der Weijde	
2023-06-24 14:41	▲ Grasmus - <i>Curruca communis</i>	1	Gijzenrooi-Oost	Martijn van der Weijde	
2023-06-24 14:44	▲ Winterkoning - <i>Troglodytes troglodytes</i>	1 baltsend / zingend	Gijzenrooi-Oost	Martijn van der Weijde	
2023-06-24 14:41	▲ Spreeuw - <i>Sturnus vulgaris</i>	1 baltsend / zingend	Gijzenrooi-Oost	Martijn van der Weijde	
2023-06-24 09:32	▲ Spreeuw - <i>Sturnus vulgaris</i>	2	Gijzenrooi-Oost	Martijn van der Weijde	

Geldrop-Mierlo (gemeente) Noord-Brabant

Details Waarnemingen Foto's Geluiden Soorten gezien Ranglijst waarnemers BioBlitzes

2022-06-30 - 2023-06-30 Selecteer een soort Alle soortgroepen Alle zeldzaamheden

Zoek Filter Wis filters Als kaart ☐ Toon geavanceerd

Datum	Soort	Aantal	Locatie	Waarnemer	
2023-06-24 22:51	▲ Zanglijster - <i>Turdus philomelos</i>	1 baltsend / zingend	Gijzenrooi-Oost	Martijn van der Weijde	📷
2023-06-24 14:44	▲ Roodborsttapuit - <i>Saxicola rubicola</i>	1	Gijzenrooi-Oost	Martijn van der Weijde	📷
2023-06-24 09:37	▲ Roodborsttapuit - <i>Saxicola rubicola</i>	4	Gijzenrooi-Oost	Martijn van der Weijde	📷
2023-06-24 09:32	▲ Roodborsttapuit - <i>Saxicola rubicola</i>	1 ♂	Gijzenrooi-Oost	Martijn van der Weijde	📷
2023-06-24 11:42	▲ Huismus - <i>Passer domesticus</i>	1	Dierenrijk Europa	Maikel	📷 📷
2023-06-24 14:50	▲ Heggenmus - <i>Prunella modularis</i>	1	Gijzenrooi-Oost	Martijn van der Weijde	📷
2023-06-24 09:35	▲ Witte Kwikstaart - <i>Motacilla alba</i>	1	Gijzenrooi-Oost	Martijn van der Weijde	📷
2023-06-24 14:42	▲ Groenling - <i>Chloris chloris</i>	1 baltsend / zingend	Gijzenrooi-Oost	Martijn van der Weijde	📷
2023-06-24 14:50	▲ Kneu - <i>Linaria cannabina</i>	1 baltsend / zingend	Gijzenrooi-Oost	Martijn van der Weijde	📷
2023-06-24 14:42	▲ Kneu - <i>Linaria cannabina</i>	1 baltsend / zingend	Gijzenrooi-Oost	Martijn van der Weijde	📷
2023-06-24 14:50	▲ Putter - <i>Carduelis carduelis</i>	2 overvliegend	Gijzenrooi-Oost	Martijn van der Weijde	📷
2023-06-24 09:38	▲ Putter - <i>Carduelis carduelis</i>	7	Gijzenrooi-Oost	Martijn van der Weijde	📷
2023-06-24 09:31	▲ Putter - <i>Carduelis carduelis</i>	2	Gijzenrooi-Oost	Martijn van der Weijde	📷
2023-06-24 14:48	▲ Geelgors - <i>Emberiza citrinella</i>	1 baltsend / zingend	Gijzenrooi-Oost	Martijn van der Weijde	📷
2023-06-24 14:45	▲ Geelgors - <i>Emberiza citrinella</i>	1 baltsend / zingend	Gijzenrooi-Oost	Martijn van der Weijde	📷
2023-06-24 14:43	▲ Geelgors - <i>Emberiza citrinella</i>	1 baltsend / zingend	Gijzenrooi-Oost	Martijn van der Weijde	📷
2023-06-24 14:41	▲ Geelgors - <i>Emberiza citrinella</i>	1 baltsend / zingend	Gijzenrooi-Oost	Martijn van der Weijde	📷
2023-06-24 14:40	▲ Rosse Woelmuis - <i>Myodes glareolus</i>	1	Gijzenrooi-Oost	Martijn van der Weijde	📷
2023-06-24 15:27	▲ West-Europese Egel - <i>Erinaceus europaeus</i>	1	Geldrop	Externe bron	📷 📷
2023-06-24 11:38	▲ Groot dikkopje - <i>Ochlodes sylvanus</i>	1 imago	Kasteeltuyn	Janny	📷 📷
2023-06-24 14:46	▲ Groot koolwitje - <i>Pieris brassicae</i>	1 imago	Gijzenrooi-Oost	Martijn van der Weijde	📷
2023-06-24 14:45	▲ Groot koolwitje - <i>Pieris brassicae</i>	2 imago	Gijzenrooi-Oost	Martijn van der Weijde	📷
2023-06-24 14:44	▲ Groot koolwitje - <i>Pieris brassicae</i>	2 imago	Gijzenrooi-Oost	Martijn van der Weijde	📷
2023-06-24 11:51	▲ Groot koolwitje - <i>Pieris brassicae</i>	1 imago	Geldrop	Ronald Engelen	📷
2023-06-24 09:39	▲ Groot koolwitje - <i>Pieris brassicae</i>	6 imago	Gijzenrooi-Oost	Martijn van der Weijde	📷

Effecten indicator soorten



Effectenindicator Natura2000-gebieden

3 Indicatie

5666 RZ



Alle activiteiten

- ### Toon effecten

Locatie: 5.5652/51.4248 Oppervlakte: 1.52 ha

Disclaimer

- De dekkingsgraad van waarnemingen uit de NDFF per locatie wisselt sterk. Als er geen waarnemingen uit de NDFF zijn, kunnen er dus wel beschermde soorten voorkomen. Een gebruiker is zelf verantwoordelijk om (eventueel met hulp van de gemeente) te achterhalen of er daadwerkelijk beschermde soorten in het plangebied voorkomen.
- Beschermde soorten die naar verwachting geen schadelijke effecten ondervinden, worden niet in de uitvoer getoond.
- De informatie uit de effectenindicator soorten is generiek. Om vast te stellen of een activiteit in de praktijk daadwerkelijk schadelijk is, is meer specifieke informatie nodig over de betreffende activiteit, de werklocatie en over het voorkomen van beschermde soorten in en rond het plangebied.

Activiteiten

☐ Slopen en/of asbest verwijderen

Een bouwwerk helemaal of voor een gedeelte slopen of van asbest ontdoen.

Deze activiteit kan leiden tot schadelijke effecten voor beschermde soorten door verlies van verblijfplaatsen in en rondom het te slopen gebouw. Denk hierbij met name aan vogels, zoals kerkuil en steenuil en vleermuizen.

☐ Woning bouwen

Het in zijn geheel nieuw plaatsen van een woning of een wijziging op een nog te bouwen nieuwe woning waarvoor al een vergunning is verleend.

Deze activiteit kan leiden tot schadelijke effecten als de bouwlocatie onderdeel is van het leefgebied van beschermde soorten.

☐ Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Hieronder wordt verstaan dat gronden of bouwwerken anders gebruikt gaan worden dan het gebruik dat in de ruimtelijke regels is vastgelegd. In de meeste gevallen zijn deze ruimtelijke regels opgenomen in de bestemmingsregels van het gemeentelijke bestemmingsplan, een beheersverordening of een voorbereidingsbesluit.

Afwijkend gebruik van gebouw of grond kan gepaard gaan met diverse activiteiten, zoals graafwerkzaamheden of slopen die kunnen leiden tot schadelijke effecten op beschermde soorten.



In het door u geselecteerde gebied komen, in combinatie met de geselecteerde activiteit(en), geen Wettelijk beschermde soorten voor waarbij schadelijke effecten worden verwacht.

3

Bijlage

Plan projectlocatie

