

QUICK SCAN FLORA EN FAUNA



Vieruitersten 24, Meijel



Datum : 30 augustus 2022

Rapportnummer : 221-MVi24-nw-v2

**Project : Quick scan flora en fauna in de omgeving
Vieruitersten 24 te Meijel**


Opdrachtgever : Pijnenburg

Datum rapport : 30 augustus 2022

Van toepassing zijnde certificaat : NEN-EN-ISO 9001, 2015
Van toepassing zijnde protocollen : --
Nummer certificaat : EC-KWA-00044

Projectleider
Collegiale toets


:
:



Voor akkoord:



Voor akkoord:



Inhoudsopgave

<u>Hfdst.</u>	<u>Titel</u>	<u>Blz.</u>
1.	Inleiding	1
2.	Inventarisatie flora en fauna	2
2.1	Algemeen	2
2.2	Beschrijving literatuuronderzoek	3
2.3	Natuurnetwerk Nederland	4
2.4	Vleermuissoorten	5
2.5	Informatie door de KNNV	6
2.6	Beschermde natuurgebieden	6
3.	Veldonderzoek door M&A	7
4.	Potentiële natuursoorten en relatie met ontwikkeling	11
5.	Conclusie	14

Bijlagen

Bijlage 1	: Situatietekening en luchtfoto
Bijlage 2a	: Foto's onderzoekslocatie en omgeving in november 2021
Bijlage 2b	: Foto's onderzoekslocatie en omgeving in juli 2022
Bijlage 3	: Natuurgegevens provincie Limburg

1. Inleiding

Op 20 oktober 2021 is door Pijnenburg Advies aan M&A Omgeving BV opdracht verleend tot het uitvoeren van een quick scan flora en fauna voor de sloop van de agrarische bedrijfs gebouwen en de nieuwbouw van een paardenhouderij op het perceel aan de Vieruitersten 24 in Meijel. De bestemming van de locatie wordt niet gewijzigd.

In verband met de sloop en nieuwbouw op de locatie dient te worden aangetoond dat er geen negatieve consequenties gelden voor de natuurwaarden in het gebied.

De onderzoekslocatie is gesitueerd in het buitengebied ten oosten van de bebouwde kom van Meijel.

Dit natuurwaardenonderzoek beschrijft of het voornemen van de sloop en nieuwbouw consequenties kunnen hebben voor de in het gebied aanwezige beschermde flora en fauna en met name voor jaarrond beschermde soorten.

De luchtfoto en situatietekening van de locatie is weergegeven in bijlage 1.

De tweede versie is opgesteld naar aanleiding van een aantal opmerkingen van de provincie Limburg op de rapportage. Deze zijn verwerkt in onderhavige tweede versie.

2. Inventarisatie flora en fauna

2.1 Algemeen

In dit onderzoek zijn de huidige natuurwaarden onderzocht middels actuele literatuurgegevens. Hiervoor kan op een drietal manieren informatie worden verkregen:

1. Literatuuronderzoek door gegevens op te vragen bij het Natuurhistorisch Genootschappen, de provincie, SOVON, Vlinderstichting, RAVON, FLORON, VZZ en EIS.
2. Literatuuronderzoek middels het nemen van contact met plaatselijke natuur- en milieu instanties als IVN-afdelingen, vogelwachten, kringen van het Natuurhistorisch Genootschap etc.
3. Aanvullende hierop, het uitvoeren van een veldonderzoek.

In onderhavige situatie zijn in eerste instantie stappen 1 en 3 uitgevoerd. Het opnemen met plaatselijke natuurverenigingen was ons inziens in dit geval niet noodzakelijk, daar de inventarisatie voldoende duidelijke gegevens opleverde.

Algemeen doel van het onderzoek is een beeld te krijgen van de aanwezige flora en fauna. Daarbij is de nadruk gelegd op beschermde, bedreigde en schaarse soorten en soorten die specifieke milieumomstandigheden indiceren.

2.2 Literatuuronderzoek

Bij het literatuuronderzoek zijn de volgende bronnen geraadpleegd;

1. Het Natuurloket (SOVON, De Vlinderstichting, RAVON, EIS Nederland, FLORON, VZZ, BLWG, NMV)
2. Ministerie EZ; Vogel- en Habitatrichtlijngebieden
3. Natuurnetwerk Nederland (natuurbeheerplan Provincie Limburg)
4. Natuurbeheerplan van de gemeente Peel en Maas
5. Wet natuurbescherming (van kracht per 1-1-2017)

Vervolgens is gekeken naar de status van de waarnemingen binnen de Wet natuurbescherming (Wnb), Commissie van Bern en de Nederlandse Rode Lijst. Voor deze en een aantal extra soorten geldt het “Nee, tenzij” principe als deze soorten in het plangebied voorkomen en bij ingrepen die het leefgebied aantasten.

Indien beschermde vogel- en/of zoogdiersoorten voorkomen, gelden binnen de Wet natuurbescherming bij de aanleg van een nieuwe functie in een gebied de voorwaarden van hoofdstuk 3. Hierin wordt voor soorten volgens de Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn het verbod om dieren te doden en verwonden, te verontrusten en de nesten, hollen of andere voortplantings- of vaste verblijfplaatsen van deze dieren te verstoren, te beschadigen of weg te nemen.

Dit betekent voor permanente nest- en/of verblijfplaatsen van beschermde soorten dat altijd een ontheffing van de Wnb aangevraagd dient te worden bij Gedeputeerde Staten. Binnen het broedseizoen wordt geen ontheffing verleend voor de verstoring hiervan.

Voor beschermde soorten die alleen in het broedseizoen op de locatie nestelen en/of verblijven, betekent dit dat geen bouw- en sloopwerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd in deze periode. Over het algemeen betreft deze periode het voorjaar en begin van de zomer, globaal van 15 maart tot 15 juli. Indien binnen deze periode bouw- en / of sloopwerkzaamheden worden verricht, dan moet een ontheffing in het kader van de Wnb bij Gedeputeerde Staten worden aangevraagd.

2.3 Natuurnetwerk Nederland

Natuurnetwerk Nederland (voorheen ecologische hoofdstructuur) is een netwerk van natuurgebieden en verbindingszones. Planten en dieren kunnen zich zo van het ene naar het andere gebied verplaatsen. Op plekken waar gaten in het netwerk zitten, legt de provincie nieuwe natuur aan.

In de omgeving van de bouwlocatie zijn geen ecologische verbindingszones of Natura 2000 gebieden aanwezig. Het meest nabij gesitueerde gebied is de Deurnesche Peel & Mariapeel (deelgebied Het Zinkske) op 700 meter ten noorden van de locatie.

De gronden van de onderzoekslocatie zijn niet aangewezen als gewenste nieuwe natuur of te verwerven percelen in het kader van natuurbeheer.

De afstanden tot de EVZ en beschermde natuurgebieden zijn voldoende groot, om te kunnen stellen dat de invloed van de sloop en nieuwbouw op het perceel niet relevant zijn voor genoemde gebieden. Door het saneren van de intensieve veehouderij op de locatie zal de stikstofdepositie voor een groot gedeelte worden gereduceerd t.o.v. de nieuwe paardenhouderij op de locatie.

Via de Atlas Limburg zijn de gegevens van inventarisaties van broedvogels bestudeerd. Uit de laatste inventarisatieronde (2016) zijn op het perceel waarnemingen gedaan van de Holenduif en in 2001 is de Zwarte Roodstaart waargenomen.

Volgens de gegevens van de NDFF zijn een drietal waarnemingen op en nabij de onderzoekslocatie bekend:

- op het naastgelegen grasveld is een levendbarende hagedis waargenomen
- waarneming van een buizerd
- steenuil in één van de stallen op de onderzoekslocatie (waarneming uit 2021)

Deze soorten zullen specifiek nader worden beschouwd in deze quick scan.

2.4 Vleermuissoorten

De meest voorkomende soorten in Nederland volgens de ‘Verspreidingsatlas vleermuizen’, maar ook in het betreffende gebied, zijn de Bruine Grootoorvleermuis, de Gewone Dwergvleermuis en de Ruige Dwergvleermuis. Verder komen in de regio de Laatvlieger, Rosse Vleermuis en Baardvleermuis veelvuldig voor in de bebouwde omgeving.



Gewone Dwergvleermuis



Bruine Grootoorvleermuis

De vleermuissoorten hebben een divers leefgebied (bossen, begroeide landschappen, nabij open water etc.). Vleermuizen hebben hun habitat (winter-, kraam-, zomer- en paar-verblijfplaatsen) vaak in bebouwing, bomen of opgaande gewassen.

Foerageergebieden en vlieg-/migratieroutes zijn afhankelijk van landschappelijke kenmerken zoals water, lijnvormige landschapselementen (kust, dijken, duinen, rivierdalen en waterpartijen) en kleinschalige groenelementen (parken, kleine bossen).

Mogelijke verblijfplaatsen van de zoogdieren zijn gebouwen, bomen, grotten, groeves, kelders, bruggen, tunnels of andere objecten met ruimte.

2.5 Informatie door het KNNV

Bij het KNNV te Zeist, Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, een vereniging voor veldbiologie, is navraag gedaan over informatie met betrekking tot natuurdata over de locatie Vieruitersten 24 in Meijel.

Uit dit telefonisch contact is duidelijk geworden dat de vereniging van de omgeving geen nadere natuurinformatie heeft.

2.6 Resultaten literatuuronderzoek

2.6.1 Vogel- en Habitatrichtlijngebieden

Via het ministerie van EZ zijn de Vogel- en Habitatrichtlijnkaarten beschouwd en hieruit kan worden geconcludeerd dat er geen Natura 2000 gebieden in de directe omgeving aanwezig zijn. Het dichtst bij gesitueerde Natura 2000 gebied is 'Deurnesche Peel & Mariapeel', waarvan het deelgebied 'Het Zinkske' op een afstand van ongeveer 700 meter ten noorden van de locatie is gesitueerd.

De ontwikkelingen op het perceel hebben gezien de afstand tot het gebied geen invloed op beschermde natuurgebieden. Door het wegvallen van een groot gedeelte van de stikstof depositie door het saneren van de intensieve veehouderij op de locatie en daarvoor in de plaats de realisatie van een paardenhouderij, zal zelfs een positief effect worden bewerkstelligd voor de Natura 2000 gebieden.

3. Veldonderzoek door M&A

Op 5 november 2021, 12 juli en 22 juli 2022 zijn veldonderzoeken uitgevoerd op de onderzoekslocatie, door [REDACTED] De heer [REDACTED] heeft deskundigheid op het gebied van flora en fauna en in het bijzonder in inheemse zoogdieren en broedvogels.

De buitentemperatuur bedroeg op 5 november 2021 ongeveer 15 °C, luchtvochtigheid 50% en 5/8 bewolkingsgraad. Er was geen neerslag. In de avondperiode bedroeg de temperatuur nog 12 °C.

De buitentemperatuur bedroeg op 12 juli 2022 (07.00 - 09.00 uur) ongeveer 16 °C, luchtvochtigheid 40% en 6/8 bewolkingsgraad. Er was geen neerslag. In de avondperiode (20.00 - 22.30 uur) bedroeg de temperatuur 18 °C.

De buitentemperatuur bedroeg op 22 juli 2022 (07.00 - 0.900 uur) ongeveer 14 °C, luchtvochtigheid 50% en 3/8 bewolkingsgraad. Er was geen neerslag. In de avondperiode (20.00 - 22.30 uur) bedroeg de temperatuur 16 °C.

Broedvogelsoorten

Tijdens de veldbezoeken is gekeken naar flora en fauna. Daarbij is op de locatie van de te slopen gebouwen (stallen, werktuigenloods, sleufsilos en verhardingen) rastermatig het gebied verkend. De milieuhinder (geluid, geur, luchtkwaliteit, licht etc.), door de sloop van de gebouwen en de latere nieuwbouw van een paardenhouderij op het perceel, zal reeds op een afstand van 100 meter minimaal zijn.

Eventuele natuurwaarden op grotere afstand zullen geen enkele invloed meer ondervinden van de werkzaamheden.

Tijdens het veldonderzoek in november 2021 zijn een aantal inheemse soorten (Koolmees, Roodborst, Houtduif, Merel, Vink) waargenomen. Tijdens het veldonderzoek in de dagperiode zijn geen verblijfplaatsen / nesten van jaarrond beschermde soorten zoals bijvoorbeeld Huismussen of Gierzwaluwen waargenomen.

Tijdens de veldonderzoeken in juli 2021 zijn eveneens een aantal inheemse soorten (Koolmees, Houtduif, Zwarte Kraai, Merel, Vink) waargenomen. Tijdens het veldonderzoek in de dagperiode zijn geen verblijfplaatsen / nesten van jaarrond beschermde soorten zoals bijvoorbeeld Huismussen, Gierzwaluwen of uilen (met name de Steenuil) waargenomen. Gierzwaluwen zijn op de locatie niet waarschijnlijk, omdat de mogelijke uitvlieghoogten beperkt zijn. Gierzwaluwen verkiezen vaak een minimale uitvlieghoogte tussen 4 en 5 meter of hoger en dit is bij de gebouwen op het perceel nauwelijks mogelijk.

De agrarische bedrijfsgebouwen zijn onderzocht op eventuele nesten / verblijfplaatsen van vogels, vleermuizen en uilen. Hierbij is niets aangetroffen. Ook bij de nadere inventarisaties in juli 2022 zijn geen nesten of verblijfplaatsen van vogels aangetroffen. Bij de inventarisatie is ook speciale aandacht besteed aan andere kenmerken van broedende vogelsoorten, zoals uitwerpselen en achtergelaten nestmateriaal. In de gebouwen is in juli 2022 met name gelet op de aanwezigheid of kenmerken van voormalige aanwezigheid van de Steenuil of andere uilsoorten. Dit met name omdat bij de NDFF een waarneming bekend is van een Steenuil in één van de gebouwen. Bij de inventarisaties in juli 2022 zijn geen kenmerken van aanwezigheid van uilen aangetroffen in de bebouwing.

Ook de eerder geconstateerde waarneming van een Buizerd kon door de inventarisaties niet worden bevestigd. De Buizerd is echter in de regio volop aanwezig en het is zeer reëel om te veronderstellen dat deze in het gebied foerageert. Broedmogelijkheden zijn echter op de onderzoekslocatie niet aanwezig, vanwege het feit dat de Buizerd bij voorkeur broedt in bomen.

Kieren en gaten in de muren van de stallen / werktuigenstalling en de aansluitingen van de muren op de daken zijn met behulp van een camera (Novascope) geïnspecteerd. Hierbij is gelet op aanwezigheid van soorten, nesten en sporen van broedvogels en vleermuizen. Hierbij zijn geen aanwijzingen aangetroffen voor de aanwezigheid van fauna.

Vleermuizen

Bij het veldbezoek is met name speciaal gelet op de aanwezigheid van verblijfplaatsen voor vleermuizen. Deze zijn echter niet aangetroffen in de te slopen bebouwing. Op de onderzoekslocatie is verder weinig begroeiing aanwezig.

Bij de veldbezoeken op 5 november 2021 in de avondperiode (van 18.30 uur tot ongeveer 22.00 uur) en 12 en 22 juli 2022 (van 20.00 tot 22.30 uur) is gebruik gemaakt van een vleermuisdetector van het type Baton en een laptop met BatScan-software voor het herkennen van vleermuisspectra. Met de detector zijn ter plaatse van het onderzoeksperceel geen waarnemingen van vleermuissoorten gedaan.

Het gebruik van de detector in de avondperioden is uitgevoerd om te verifiëren of er sprake is van vleermuizen die de bebouwing op het perceel gebruiken als verblijfplaats. Dit is hier niet het geval. Ons inziens is geen verder onderzoek noodzakelijk volgens het vleermuisprotocol van het NGB.

Andere hulpmiddelen, zoals een mistnetonderzoek of boomcamera zijn niet toegepast omdat met onderhavig onderzoek reeds voldoende informatie is verkregen over de aanwezigheid van vleermuizen.

Overige soorten

Voor de overige soorten is met name gelet op marterachtigen, zoals de steenmarter, bunzing en hermelijn. Er zijn geen sluip- of vraatsporen aangetroffen van deze soorten. De kans dat deze zullen worden aangetroffen zijn als klein te beschouwen. De bebouwing leent zich namelijk niet als verblijfplaats voor deze soorten, vanwege het feit dat de stallen hermetisch gesloten zijn i.v.m. ongediertebestrijding en de werktuigenloods juist te open is, zodat geen schuilmogelijkheden voorhanden zijn.

Op de akkerlanden rondom het perceel zijn sporen van de Das en van reën aangetroffen. Deze gebruiken het gebied als foeragegebied, maar op de onderzoekslocatie zelf zijn geen sporen aangetroffen en er zijn voor deze soorten ook geen verblijfplaatsen op de onderzoekslocatie.

Op 12 en 22 juli zijn de aangrenzende graslanden / weien nader geïnspecteerd op de aanwezigheid van de levendbarende hagedis. Deze is volgens de NDFF waargenomen op het grasland. Op zich is deze waarneming discutabel omdat de levendbarende hagedis een vochtminnende soort is. Deze zal graag op oevers en vochtige terreindelen verblijven. Ook wordt de soort aangetroffen in het ruige gras. Dit soort grassen zijn alleen aanwezig aan de achterzijde (richting Molenbaan). Aan de west- en oostzijde zijn graslanden die regelmatig worden bewerkt (o.a. maaien).

Tijdens de inventarisaties in juli zijn geen hagedissen aangetroffen op het perceel of op de graslanden rond de onderzoekslocatie.

4. Potentiële natuursoorten en relatie met ontwikkeling

De fysieke ontwikkeling ter plaatse betreft de sloop van stallen, werktuigenloods, schuur, sleufsilo's en verhardingen en de realisatie van een nieuwe paardenhouderij op het perceel. Het aantal verkeersontwikkelingen zal door de werkzaamheden niet toenemen. De emissie van geluid, geur of stof zal door de nieuwe ontwikkeling ruimschoots binnen de te stellen normering blijven.

Door de sanering van de intensieve veehouderij op de locatie zal de stikstofdepositie voor een groot gedeelte wegvallen, zodat qua stikstofdepositie een positief effect wordt bewerkstelligd op de natuurgebieden.

Per natuursoort zal worden aangegeven wat de invloed van de ontwikkeling is op de mogelijk voorkomende natuursoorten zal zijn.

Flora

Tijdens het veldbezoek zijn geen beschermde soorten planten aangetroffen. Er is dus geen invloed van de ontwikkeling hierop.

Vogels

Uit de bevindingen van het veldbezoek blijkt dat het onderzoeksgebied geschikt is als onderdeel van het foerageergebied. Er is weinig begroeiing aanwezig op het perceel, zodat broedplaatsen op het perceel schaars zijn. Er zijn tijdens het veldonderzoek een aantal inheemse soorten waargenomen.

Er zijn in de te slopen bebouwing geen broed- / verblijfplaatsen aanwezig. Omdat bij de inventarisatie geen beschermde soorten zijn waargenomen, is het niet waarschijnlijk dat verstoring optreedt bij de werkzaamheden.

De eerder uit waarnemingen van het NDFF aangetroffen Steenuil in 2021, is niet meer aangetroffen. Ook van andere uilen zijn geen sporen aangetroffen in de bebouwing op de locatie.

De Buizerd is evenmin aangetroffen op het perceel maar zal het gebied mogelijk gebruiken als foerageergebied. Broedmogelijkheden zijn niet aanwezig voor deze soort op het perceel.

In de nieuwe situatie blijven de foerageermogelijkheden aanwezig, zodat er netto geen wijzigingen in het gebied optreden voor broedvogelsoorten. Ook in de omgeving blijven ruimschoots voldoende mogelijkheden over, zodat de invloed op de vogels buiten het broedseizoen te verwaarlozen is.

Zoogdieren

Uit de bevindingen van het veldbezoek blijkt dat het onderzoeksgebied niet geschikt is voor grondgebonden zoogdieren, omdat het akkerbouwperceel regelmatig wordt bewerkt. Tijdens het veldbezoek zijn ook geen sporen aangetroffen van beschermde zoogdieren.

Rondom het plangebied zijn geen sporen of mogelijk verblijfplaatsen aangetroffen van vleermuizen. De te slopen bebouwing is hierop degelijk onderzocht. Het is wel mogelijk dat het gebied wordt gebruikt als foerageergebied.

De werkzaamheden tijdens de sloop en nieuwbouw zullen dus geen verstoring betekenen van eventueel vleermuizen. Ook hiervoor geldt dat er voldoende mogelijkheden in de directe omgeving resteren, zodat de invloed van de ontwikkeling op genoemde soorten als klein beschouwd kan worden.

Op de akkerlanden rondom het perceel zijn sporen van de Das en reeën aangetroffen. Deze gebruiken het gebied als foeragegebied, maar op de onderzoekslocatie zelf zijn geen sporen aangetroffen.

Reptielen en amfibieën

Uit de bevindingen van het veldbezoek blijkt dat de omgeving van het onderzoeksgebied niet geschikt is als onderdeel van het leefgebied van zowel reptielen als amfibieën. De voorwaarde hiervoor is de aanwezigheid van water in de onmiddellijke nabijheid en dat is hier niet het geval.

Voor reptielen die op droge gronden habiteren is het perceel minder geschikt, vanwege de aanwezigheid van de verhardingen. In de omgeving zijn er ruimschoots habitats mogelijk voor deze soorten.

De bij waarnemingen van het NDFF aangetroffen levendbarende hagedissen, zijn niet aangetroffen in het plangebied of de aangrenzende graslanden. De kans hierop is vanwege de bewerking (o.a. maaien) van de weiden minimaal. De plannen op de onderzoekslocaties hebben geen invloed op het leefgebied van de levendbarende hagedissen.

Vlinders en libellen

Uit de bevindingen van het veldbezoek blijkt dat het onderzoeksperceel zelf minder geschikt is als onderdeel van het leefgebied van zowel vlinders als libellen, vanwege het ontbreken van waadplanten op het perceel en van water in de directe nabijheid. In de omgeving van het onderzoeksgebied is wel een juiste biotoop voor vlinders en libellen aanwezig. Tijdens het veldbezoek zijn geen soorten geconstateerd.

Mieren en kevers of overige ongewervelden

Uit de bevindingen van het veldbezoek blijkt dat het onderzoeksgebied niet geschikt is voor beschermde soorten kevers, omdat er geen geschikte biotopen aanwezig zijn. Voor het voorkomen van beschermde soorten mieren is de aanwezigheid van open naaldbossen een voorwaarde.

Tijdens het veldbezoek zijn geen soorten geconstateerd. Ook hier geldt dat de ontwikkeling op het perceel geen invloed heeft op de aanwezigheid van mieren, kevers of overige ongewervelden in het gebied.

Vissen

Uit de bevindingen van het veldbezoek blijkt dat in de omgeving van het onderzoeksgebied geen vissen kunnen voorkomen, omdat er geen water in de directe nabijheid aanwezig is. De sloten in de directe omgeving zijn hiervoor niet geschikt.

5. Conclusie

Door het literatuuronderzoek van de inventarisatie is aangetoond dat het mogelijk is dat in het gebied beschermde flora of fauna (voornamelijk vleermuizen, broed- en wintervogels) voor kunnen komen (zie inventarisatie Natuurloket).

In de nabijheid van het perceel zijn tijdens de veldbezoeken in november 2021 en juli 2022 echter geen waarnemingen gedaan van schaarse soorten. Ook rondom het perceel zijn bij de inventarisaties geen waarnemingen gedaan van beschermde soorten (waaronder jaarrond beschermde soorten, zoals bijvoorbeeld Huismussen, (nesten van) Gierzwaluwen, uilen en vleermuissoorten.

De veldonderzoeken, uitgevoerd in de dag- en avondperiode op 5 november 2021 en 22 juli 2022, is buiten het broedvogelseizoen uitgevoerd. Daarom is er speciale aandacht besteed aan andere kenmerken van broedende vogelsoorten. Onder andere uitwerpselen van broedvogelsoorten, achtergebleven nestmaterialen en vraatsporen zijn kenmerken waarop speciaal is gelet. De veldonderzoeken op 12 juli 2022 zijn wel binnen het vogelbroedseizoen uitgevoerd. De veldonderzoeken kunnen daarom als vrij uitvoerig worden beschouwd.

Bij de inventarisaties is ook aandacht besteed aan verblijfplaatsen van vleermuizen en nestkasten en -mogelijkheden in het gebied. Bij de inventarisatie van de vleermuizen is extra aandacht besteed aan mestsporen, keutels en vraatsporen.

De kieren en openingen in de te slopen bebouwing zijn onderzocht met een camera (Novascope) en hierbij zijn geen aanwijzingen aangetroffen voor verblijfplaatsen van fauna.

De afstanden tot de ecologische verbindingzones en waardevolle natuurgebieden zijn voldoende groot om te kunnen stellen dat de ontwikkelingen in het plangebied een positieve invloed zullen hebben op deze gebieden. Dit is vanwege het wegvallen van een groot gedeelte van de stikstofdepositie door de sanering van de intensieve veehouderij op de locatie.

Op de akkerlanden rondom het perceel zijn sporen van de Das en van reeën aangetroffen. Deze gebruiken het gebied als foeragegebied, maar op de onderzoekslocatie zelf zijn geen sporen aangetroffen.

Door de sloop van de bebouwing en de realisatie van een nieuwe paardenhouderij op het perceel, wordt het karakter van het gebied niet beïnvloed. Er verdwijnen geen verblijfs- of broedmogelijkheden, gezien de resultaten van de veldonderzoeken.

Bij de werkzaamheden dient niettemin aandacht te worden besteed aan eventuele verstoring van natuurwaarden in het algemeen. Door extra zorg hieraan te besteden tijdens de sloop- en bouwwerkzaamheden, wordt vermeden dat de dieren hiervan teveel hinder zullen ondervinden.

Op grond van deze inventarisatie gelden er geen belemmeringen voor de plannen op grond van de natuurwaarden.

Bijlage 1 : Situatietekening en luchtfoto

Vieruitersten 24, Meijel

Quick scan flora en fauna

Legenda



Vieruitersten 24

Vieruitersten 24

t' Molentje

Helenavaart

Kanaal van Deurne


Alcosh Medical B.V.

Molenbaan

Google Earth

200 m





2599

2598

24

226

1482

Vieruitersten

Bijlage 2a : Foto's onderzoekslocatie en omgeving november 2021









sporen van de Das 



loopsporen van de Das 



Bijlage 2b : Foto's onderzoekslocatie en omgeving juli 2022












Bijlage 3 : Natuurgegevens provincie Limburg



Kilometerblok 58-13-11

Broedvogels Vlaktekend 3

In dit kilometerblok zijn 132 territoria vastgesteld, afkomstig van 37 soorten. Klik op een soortnaam in de tabel voor de locatie van de stip en vice versa. Klik nogmaals om een label te verwijderen.

Kwantitatief onderzochte soorten				
x-coörd	y-coörd	jaar	n	soort
190710	374775	2016	1	Appelvink
190172	374849	2016	1	Blaauwborst 1
190303	374778	2016	1	Blaauwborst 2
190341	374612	2016	1	Blaauwborst 3
190394	374917	2016	1	Blaauwborst 4
190993	374100	2016	1	Boemklever 1
190492	374999	2016	1	Boemklever 2
190721	374832	2016	1	Boemklever 3
190651	374741	2016	1	Boemklever 4
190793	374527	2016	1	Boemklever 5
190962	374267	2016	1	Boemklever 6
190775	374462	2016	1	Boemkruiper 1
190914	374493	2016	1	Boemkruiper 2
190742	374603	2016	1	Boemkruiper 3
190651	374762	2016	1	Boemkruiper 4
190526	374948	2016	1	Boemkruiper 5
190199	374424	2016	1	Boempieper 1
190927	374052	2016	1	Boempieper 2
190941	374557	2016	1	Boempieper 3
190867	374745	2016	1	Boempieper 4
190780	374944	2016	1	Boempieper 5

naar topografie

Extra ondergrond:

zoom uit

☒ onvolledig onderzocht

☒ nog niet geactualiseerd

☒ buiten provincie

Beschikbare kaartlagen


Thema	periode
☐ Topografie oud	1980 - 1999
☒ Topografie recent	2000 - 2019
☐ Topografie nieuw grijs	2020 -
☐ Topografie nieuw kleur	2020 -
☐ Broedvogels Vlaktekend 1	1990 - 1997
☐ Broedvogels Vlaktekend 2	1998 - 2011
☒ Broedvogels Vlaktekend 3	2012 - 2020
☐ Broedvogels Goud-Groen 1	2015 - 2020
☐ Flora Vlaktekend 1	1983 - 1997
☐ Flora Vlaktekend 2	1998 - 2007
☐ Flora Vlaktekend 3	2006 - 2019
☐ Flora Goud-Groen 1	2012 - 2020
☐ Vegetatie Vlaktekend 1	1983 - 1997
☐ Vegetatie Vlaktekend 2	1998 - 2007
☐ Vegetatie Vlaktekend 3	2006 - 2019
☐ Vegetatie Goud-Groen 1	2012 - 2020
☐ Beheertypen	2011 - 2021

Legenda Broedvogels Vlaktekend 3

soort legenda

- Soort van de Rode Lijst
- Aandachtssoort (o.a. voormalige Rode Lijst-soorten)
- Schaarse of zeldzame soort

Algemene soort (niet op de kaart, wel in de lijst)



Kilometerblok 58-13-11

Broedvogels Vlakte 2

In dit kilometerblok zijn 53 territoria vastgesteld, afkomstig van 27 soorten. Klik op een soortnaam in de tabel voor de locatie van de stip en vice versa.
Klik nogmaals om een label te verwijderen.

Kwantitatief onderzochte soorten				
x-coörd	y-coörd	jaar	n	soort
190837	374782	2001	1	Bonte Vliegenvanger 1
190874	374498	2001	1	Bonte Vliegenvanger 2
190592	374923	2001	1	Boomklever 1
190628	374785	2001	1	Boomklever 2
190749	374599	2001	1	Boomklever 3
190861	374418	2001	1	Boomklever 4
190523	374976	2001	1	Boomkruiper 1
190707	374813	2001	1	Boomkruiper 2
190751	374586	2001	1	Boomkruiper 3
190803	374398	2001	1	Boomkruiper 4
190877	374821	2001	1	Boomkruiper 5
190947	374522	2001	1	Boomkruiper 5
190821	374681	2001	1	Boompieper 1
190856	374967	2001	1	Boompieper 2
190900	374894	2001	1	Boompieper 3
190912	374615	2001	1	Boompieper 4
190966	374741	2001	1	Boompieper 5
190643	374929	2001	1	Bosrietzanger
190896	374272	2001	1	Braamsluiper
190863	374143	2001	1	Gekraagde Roodstaart
190295	374137	2001	1	Grasmus 1

☒ onvolledig onderzocht

☒ buiten provincie

naar topografie

zoom uit

Extra ondergrond:

Beschikbare kaartlagen

Thema

periode

☐ Topografie oud

1980 - 1999

☒ Topografie recent

2000 - 2019

☐ Topografie nieuw grijs

2020 -

☐ Topografie nieuw kleur

2020 -

☐ Broedvogels Vlakte 1

1990 - 1997

☒ Broedvogels Vlakte 2

1998 - 2011

☐ Broedvogels Vlakte 3

2012 - 2020

☐ Broedvogels Goud-Groen 1

2015 - 2020

☐ Flora Vlakte 1

1983 - 1997

☐ Flora Vlakte 2

1998 - 2007

☐ Flora Vlakte 3

2006 - 2019

☐ Flora Goud-Groen 1

2012 - 2020

☐ Vegetatie Vlakte 1

1983 - 1997

☐ Vegetatie Vlakte 2

1998 - 2007

☐ Vegetatie Vlakte 3

2006 - 2019

☐ Vegetatie Goud-Groen 1

2012 - 2020

☐ Beheertypen

2011 - 2021

Legenda Broedvogels Vlakte 2

☒ Soort van de Rode Lijst

☒ Aandachtssoort (o.a. voormalige C-soorten)

☒ Schaarse of zeldzame soort

Algemene soort (niet op de kaart, wel in de lijst)

sluit legenda