

Beplantingsplan locatie Hoevenstraat 2 te Beringe

In het kader van
Het wijzigen van de bestemming



Datum; 25-07-2021

Zaaknummer; 1894/2021/2410953

Document; 1894/2021/2421981

Aanvrager:

Mevr. AMC Steeghs-Verstappen

Hoevenstraat 2

5986 ND BERINGE

Inleiding

Mevrouw AMC Steeghs – Verstappen is gestopt met de intensieve veehouderij in het kader van de Stoppersregeling 2020. En is daarom voornemens haar woning met de huidige “bestemming Agrarisch – Intensieve veehouderij te laten wijzigen naar de bestemming Wonen met opslag (voor eigen materieel) en caravanstalling.

Collegestandpunt

Uit analyse is gebleken dat in principe medewerking kan worden verleend aan de wijziging naar de bestemming ‘Wonen met een aanduiding voor caravanstalling’, onder voorwaarden dat:

- De locatie landschappelijk wordt ingepast conform het Kwaliteitskader Buitengebied;
- Het perceel dient landschappelijk ingepast te worden (10% van de oppervlakte van het bouwvlak Wonen dient ingepast te worden.



Beplantingsplan

nieuw aan
te leggen
beplantingsplan
432 m²
9x48 meter.

bestaande
boom
bestaande
boom

bestaande
tuin

verharding

Hoevenstraat

Dit is een afdruk uit NedBrowser. Aan dit document kunnen geen betrouwbare maten en/of rechten worden ontleend.



Nieuw aan te leggen beplantingsplan.

Breed 9 meter en een lengte van 48
meter

met in totaal 6


Hoogstamfruitbomen En op de
bodem een kruidenrijke berm

Hoogstam Fruitbomen

2 x Appel (sterappel)



1 x Peer (concorde)



1 x pruim (opal)



2x Kers (Prunus Avium / spekkers)



Het jaarlijks onderhoud van hoogstam fruitbomen komt neer op bemesten, snoeien en plukken en tussentijds controleren op aantastingen. Daarnaast heeft ook de fruitweide zelf verzorging nodig. Vaak wordt voor bemesting gebruik gemaakt van dierlijke mest.

Kruidenrijke berm

Bloemrijk bermmengsel 100% kruiden

Eenvoudig, maar breed inzetbaar bloemrijke bermmengsel voor alle gronden. Dit bloemrijk bermmengsel heeft een ingetogen karakter, echter door goed beheer kan er zich een duurzame natuurlijke vegetatie ontwikkelen. Het mengsel bereikt een hoogte van +1-80 cm en is daardoor geschikt voor toepassing bij wegen en in bermen.

Grondsoort:	Alle grondsoorten
Zaaitijd:	Bij voorkeur in het voor- en/of najaar.
Zaaiadvies:	10-15 Kg/ha (1 tot 1.5 gram/m ²)
Aantal soorten:	22

Samenstelling:

Avondkoekoeksbloem	<i>Silene latifolia</i> subsp. alba	Wit
Duizendblad	<i>Achillea millefolium</i>	Wit
Echte kamille	<i>Matricaria chamomilla</i>	Geel/wit
Echte koekoeksbloem	<i>Silene flos-cuculi</i>	Roze
Fluitenkruid	<i>Anthriscus sylvestris</i>	Wit
Gewone margriet	<i>Chrysanthemum leucanthemum</i>	Wit
Grasklokje	<i>Campanula rotundifolia</i>	Blauw
Herderstasje	<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Wit
Incarnaatklaver	<i>Trifolium incarnatum</i>	Rood
Klaproos	<i>Papaver rhoeas</i>	Rood
Korenbloem	<i>Centaurea cyanus</i>	Blauw
Luzerne	<i>Medicago sativa</i>	Paars
Pastinaak	<i>Pastinaca sativa</i>	Geel
peen	<i>Daucus carota</i>	Wit
Rode klaver	<i>Trifolium pratense</i>	Rood
Rolklaver	<i>Lotus corniculatus</i>	Geel
Sint Janskruid	<i>Hypericum perforatum</i>	Geel
Smalle weegbree	<i>Plantago lanceolata</i>	Zwart/grijs
Scherpe boterbloem	<i>Ranunculus acris</i>	Geel
Veldzuring	<i>Rumex acetosa</i>	Rood
Vlasbekje	<i>Linaria vulgaris</i>	Geel
Witte klaver	<i>Trifolium repens</i>	Wit

INZAAI EN ONDERHOUD

NATUURMENGSELS

BODEMGESTELDHEID EN ZAAIBEDBEREIDING

Arme, schralere grond (met zo min mogelijk organische stof) heeft de voorkeur. Start met een schone grond; voorkom en bestrijd ongewenst groen door middel van bijvoorbeeld een vals zaaibed te maken. Een fijnkorrelig zaaibed geeft een vlotte kieming.

BEMESTING

Het is aan te bevelen geen stikstofbemesting (N) te geven. Hoe armer de grond, des te rijker de kruidenvegetatie. Regelmatig maaien en afvoeren verschaalt de bodem.

ZAAIZAADHOEEVEELHEID

Niet afwijken van de aanbevolen zaaizaadhoeveelheid! Hogere zaaidichtheden verstoren de balans van de afzonderlijke soorten.

ZAAIPERIODE

Eenjarige mengsels van maart t/m juni en meerjarige mengsels maart t/m mei en september en oktober.

MAAIEN EN AFVOEREN

Voor meerjarige mengsels geldt afhankelijk van de groei een of twee keer per jaar maaien; indien u twee keer maait, doe dit dan bij voorkeur rond eind juni en in het late najaar. Gebruik een vingerbalk of een cirkelmaaier (maaihoogte 10 of 15 centimeter). Tekort maaien geeft beschadiging van de rozetten, wat een goede hergroei verslechtert. Laat het maaisel enkele dagen narijpen; dit bevordert een goede verspreiding van de zaden. Regelmatig maaien en afvoeren verschaalt de bodem.

ZAAITECHNIEK

Zaai als er voldoende vocht in de grond zit en de bodemtemperatuur niet te laag is. Niet dieper zaaien dan de dikte van de zaden. Na het zaaien licht inwerken of harken en aandrukken.

Aanrollen bij een droge periode bevordert de kieming.

Tip: Meng het zaad met scherpzand of gemalen zemelen of vulstof: hiermee vergroot u het volume van het zaaigemak.

Tip: Bijzaaien is de eerste jaren noodzakelijk voor een blijvende bloemenweide



Mevrouw AMC Steeghs-Verstappen

Beringe 25-7-2021

Gewijzigd 3-10-2021